

ZMODYFIKOWANY TEST Z NIEBIESKIM BARWNIKIEM EVANSA (*Donzelli 2001*)

Modified Evan's Blue Dye Test – test przesiewowy dla chorych z tracheostomią

Czułość 82% swoistość 38%, wentylowani: czułość 100%, niewentylowani 76%, swoistość 33-40%, *Belafsky 2003*

.....
Imię i Nazwisko

.....
Data badania

.....
Badający

PRÓBA 1

Krok 1. Posadź chorego. Odessij wydzielinę znad mankietu, o ile rurka wyposażona jest w taką możliwość, następnie odblokuj mankiet rurki i odessij wydzielinę z dróg oddechowych (przez rurkę) oraz z jamy ustnej

Krok 2.

Podaj choremu doustnie 3 x 15ml zabarwionego na niebiesko pokruszonego lodu (lub innej testowej substancji – np. woda, papka).

Krok 3.

Odessij przez rurkę natychmiast po podaniu 3 porcji.

Krok 4. Czas 30 minut

Odessij przez rurkę po upływie 30 min.

Krok 5. Czas 60 minut

Odessij przez rurkę po upływie 60 min.

**Obecność barwnika
w odsysanej
wydzielinie**

NIE

TAK

PRÓBA 2 po upływie ≥ 60 minut od poprzedniej

Krok 1. Posadź chorego. Odessij wydzielinę znad mankietu, o ile rurka wyposażona jest w taką możliwość, następnie odblokuj mankiet rurki i odessij wydzielinę z dróg oddechowych (przez rurkę) oraz z jamy ustnej

Krok 2.

Podaj choremu doustnie 3 x 15ml zabarwionego na niebiesko pokruszonego lodu (lub innej testowej substancji – np. woda, papka).

Krok 3.

Odessij przez rurkę natychmiast po podaniu 3 porcji.

Krok 4. Czas 30 minut

Odessij przez rurkę po upływie 30 min.

Krok 5. Czas 60 minut

Odessij przez rurkę po upływie 60 min.

PRÓBA 3 po upływie ≥ 60 minut od poprzedniej

Krok 1. Posadź chorego. Odessij wydzielinę znad mankietu, o ile rurka wyposażona jest w taką możliwość, następnie odblokuj mankiet rurki i odessij wydzielinę z dróg oddechowych (przez rurkę) oraz z jamy ustnej

Krok 2.

Podaj choremu doustnie 3 x 15ml zabarwionego na niebiesko pokruszonego lodu (lub innej testowej substancji – np. woda, papka).

Krok 3.

Odessij przez rurkę natychmiast po podaniu 3 porcji.

Krok 4. Czas 30 minut

Odessij przez rurkę po upływie 30 min.

Krok 5. Czas 60 minut

Odessij przez rurkę po upływie 60 min.