

Przegląd objawów dysfagii towarzyszących uszkodzeniom różnych struktur

NIESPRAWNA STRUKTURA	FAZA USTNA WSTĘPNA	FAZA USTNA	FAZA GARDŁOWA	FAZA PRZEŁYKOWA
Wargi	<ul style="list-style-type: none"> • trudność w zebraniu pokarmu z łyżki • wyciekanie płynów z jamy ustnej 	<ul style="list-style-type: none"> • wyciekanie pokarmu/ płynu z jamy ustnej w trakcie tworzenia kęsa 	bez wpływu	bez wpływu
Policzki	bez wpływu	<ul style="list-style-type: none"> • trudności w tworzeniu kęsa • zaleganie pokarmu w przedsionku policzka 	bez wpływu	bez wpływu
Zęby	<ul style="list-style-type: none"> • utrudnione odgryzanie kęsa 	<ul style="list-style-type: none"> • utrudnione rozdrobnienie pokarmu • utrudnione tworzenie kęsa 	bez wpływu	bez wpływu
Mięśnie żwacze	<ul style="list-style-type: none"> • utrudnione otwarcie / zamknięcie żuchwy 	<ul style="list-style-type: none"> • utrudnione rozdrobnienie pokarmu • utrudnione tworzenie kęsa 	bez wpływu	bez wpływu
Język - ruchy boczne	bez wpływu	<ul style="list-style-type: none"> • trudności w tworzeniu kęsa • zaleganie pokarmu w przedsionku policzka 	bez wpływu	bez wpływu
Język – unoszenie do podniebienia	bez wpływu	<ul style="list-style-type: none"> • trudność w przesuwaniu kęsa w kierunku gardła • zaleganie pokarmu pod językiem • niekontrolowane zaciekanie kęsa do gardła – leaking – ryzyko aspiracji 	bez wpływu	bez wpływu
Język – ruch wsteczny w kierunku gardła	bez wpływu	<ul style="list-style-type: none"> • trudność w przesuwaniu kęsa • zaleganie pokarmu na języku 	<ul style="list-style-type: none"> • upośledzone pochycenie nagłośni • zaleganie pokarmu w dołkach nagłośniowych • ryzyko aspiracji 	bez wpływu
Podniebienie miękkie	bez wpływu	<ul style="list-style-type: none"> • niekontrolowane zaciekanie kęsa do gardła – leaking • ryzyko aspiracji 	<ul style="list-style-type: none"> • brak podciśnienia pomocnego w przemieszczeniu do gardła • regurgitacja płynu/pokarmu do nosa • zwiększenie ilości wydzieliny z nosa • kichanie 	bez wpływu
Język i podniebienie – zaburzenia	bez wpływu	<ul style="list-style-type: none"> • niekontrolowane zaciekanie kęsa do gardła – leaking • ryzyko aspiracji 	<ul style="list-style-type: none"> • zaburzone/opóźnione wyzwalanie odruchu połykania 	bez wpływu

Przegląd objawów dysfagii towarzyszących uszkodzeniom różnych struktur

czucia					
NIESPRAWNA STRUKTURA	FAZA USTNA WSTĘPNA	FAZA USTNA	FAZA GARDŁOWA		FAZA PRZEŁYKOWA
Mięśnie tylnej ściany gardła	bez wpływu	bez wpływu	<ul style="list-style-type: none"> • zwolniony gardłowy pasaż kęsa • zaleganie pokarmu w gardle dolnym • uczucie zalegania • ryzyko aspiracji 		bez wpływu
Zewnętrzne mięśnie krtani	bez wpływu	bez wpływu	<ul style="list-style-type: none"> • upośledzona elewacja krtani • wtórne zaburzenia otwarcia górnego zwieracza przełyku • zalegania w zachyłkach gruszkowatych • ryzyko aspiracji 		<ul style="list-style-type: none"> • utrudnione/ opóźnione rozpoczęcie fazy przełykowej
Wewnętrzne mięśnie krtani	bez wpływu	bez wpływu	<ul style="list-style-type: none"> • brak domknięcia fałdów głosowych • brak domknięcia fałdów rzekomych • brak ochrony dróg oddechowych • ryzyko aspiracji 		bez wpływu
Gardło dolne i krtani- zaburzenia czucia	bez wpływu	bez wpływu	<ul style="list-style-type: none"> • upośledzone mechanizmy protekcyjne krtani • nieme penetracje i aspiracje 		bez wpływu
Przełyk	bez wpływu	bez wpływu	bez wpływu		<ul style="list-style-type: none"> • utrudniony/spowolniony pasaż kęsa • uczucie ucisku, bólu, zalegania • reflux przełykowo-gardłowy